

# Докажана комбинација во нов иновативен и паметен инхалер

Комбинацијата **Fluticasone propionate** и **Salmeterol** е ефикасна терапија кај пациентите со **АСТМА<sup>1</sup>** и **ХОББ<sup>2</sup>**.

Нередовното земање на терапијата се одразува на слаба контрола на овие болести и чести егзацербации.

**АирФлуСал Форспиро** е создаден според препораките на пациентите и со него се максимизирани можностите за едноставна употреба на терапијата.<sup>3</sup>

**АирФлуСал Форспиро** е единствен награден инхалер за дизајн и изглед (REDDOT)\*

**НА ПОЗИТИВНА ЛИСТА  
БЕЗ ДОПЛАТА**

\* Интернационална награда за производи што се издвојуваат од другите истонаменски производи по својот изглед и дизајн.



**AirFluSal<sup>®</sup>**  
Forspiro

salmeterol/fluticasone propionate

Прашок за инхалирање, поделен  
60 дози, 50/250, 50/500 mcg

## Начин на употреба


**1.** Отворете го виолетовото капаче надолу за да се открие апликаторот за уста.



**2.** Припремете ја дозата со странично подигнување на белата рачка нагоре, до крај, се додека се слушне „клик“. Потоа белата рачка се враќа назад во првобитната положба.



**3.** Ставете го делот за инхалирање во уста и вдишете длабоко (не преку нос). Извадете го инхалерот од уста и задржете го здивот 5-10 сек. Потоа полека издишете (не во инхалерот).



Информативниот прозорец ги покажува искористените дози. Празните блистери лесно се отстрануваат.

Скратен опис на карактеристиките на лекот Airflusal Forspiro :

### КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН СОСТАВ:

- АирФлуСал Форспирио 50 микрограми/250 микрограми/доза, прашок за инхалирање

- АирФлуСал Форспирио 50 микрограми/500 микрограми/доза, прашок за инхалирање

**Терапевтски индикации: АСТМА:** - пациенти кои не се адекватно контролирани со инхалаторен кортикостероид и „по потреба“ инхалираат бета 2 агонист со кратко дејство

- пациенти адекватно контролирани со двата лека; инхалаторен кортикостероид и бета 2 агонист со долго дејство.

**ХОББ:** пациенти со ХОББ со FEV1 < 60% од предвидениот нормален (пред бронходилататор) и историја на повторувачки егзацербации, кои имаат значајни симптоми и покрај регуларната бронходилататорна терапија. **Дозирање и начин на употреба - АСТМА:** Возрасни и адолесценти постари од 12 години: Една инхалација (50 микрограми салметерол и 250 микрограми флутиказон пропионат) два пати на ден или една инхалација (50 микрограми салметерол и 500 микрограми флутиказон пропионат) два пати на ден. **ХОББ:** Една инхалација 50 микрограми салметерол и 500 микрограми флутиказон пропионат два пати на ден. **Контраиндикации:** АирФлуСал Форспирио е контраиндициран кај пациенти со историја на хиперсензитивност (алергија) на било која од активните супстанции или помошните состојки. **Интеракции:** И не-селективните како и селективните бета-блокатори треба да се избегнуваат освен ако не постои неопходна причина за нивна употреба. Заедничка употреба на други лекови кои содржат бета адренергици може да има потенцијално адитивен ефект. **Бременост и доене:** Употребата треба да биде ограничена само на оние случаи каде очекуваната корист за мајката го надминува ризикот за фетусот. **Несакани дејства: многу чести** (главоболка, назофарингитис) **чести** (хипокалемија, зарипнатост, синуситис, контузии, мускулни грчеви, мијалгии, артралгии) **Помалку чести** (диспнеа, хипергликемија, анксиозност, нарушен сон, тремор, тахикардија, палпитации, ангина пекторис, атријална фибрилација) **ретко** (ангиоедем, бронхоспазам, анафилактичен шок, кушингов синдром, бихејвиорални нарушувања, депресија, агресија, суправентрикуларна тахикардија и екстрасистоли). **Начин на чување:** Да се чува на температура до 25° C. **Лекот се чува на места недостапни за деца. Носител на одобрението за ставање во промет: Лек Скопје ДООЕЛ, Перо Наков бр.33, Скопје, Р. Македонија. Датум на првото одобрение за ставање во промет: 09.05.2014.**

1. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2010. Available from: [www.ginaasthma.org](http://www.ginaasthma.org).

2. From the Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Available from: [www.goldcopd.org](http://www.goldcopd.org).

3. Small M et al. Importance of inhaler-device satisfaction in asthma treatment: real-world observations of physician-observed compliance and clinical/patient reported outcomes. Adv Ther 2011; 28(3):202-212.



член на компанијата Sandoz

**ЛЕК СКОПЈЕ ДООЕЛ**  
„Перо Наков“ бр.33,  
1000 Скопје, Р. Македонија  
тел. +38922550800  
факс +38922551485

