

Сторидорне 75

B01AC17 Tirofiban**** 10 mg P инјекции ЈП *

*Индикации:

а. Пациенти со инфаркт на миокардот, (најмногу до 35-тиот ден по инфарктот), со шифра од I20 до I23 според МКБ10 класификација, по препорака на кардиолог или интернист ✓

б. Пациенти со акутен коронарен синдром без елевација на ST сегментот (нестабилна ангина или инфаркт на миокардот без Q бран), вклучувајќи ги пациентите со стент по перкутана коронарна интервенција, (до 12 месеци), со шифра од I20 до I23, според МКБ10 класификација, по препорака на кардиолог или интернист

в. Пациенти со акутен инфаркт на миокардот со елевација на ST-сегментот, кај пациенти подобни за терапија со тромболитици, (најмалку 4 недели до 12 месеци), со шифра од I20 до I23, според МКБ10 класификација, по препорака на кардиолог или интернист

г. Пациенти со исхемичен мозочен удар, (од 7 дена до 6 месеци), со шифра од I63 до I64, според МКБ10 класификација, по препорака на невролог или невропсихијатар

д. Пациенти со потврдена периферна артериска оклузивна болест, (од 6 до 12 месеци), со шифра од I65 до I66, I70 и I74, според МКБ10 класификација, по препорака на торакален хирург, васкуларен хирург, кардиоваскуларен хирург по извршена хируршка интервенција или по препорака од болнички/клинички конзилиум.

~~**Индикации: Комбинирана терапија со ацетилсалицилна киселина по имплантација на стент во времетраење до 1 месец~~

~~***Индикации: Пациенти со СТЕМИ пред примарна ПКИ~~

~~****Индикации: Пациенти со нестабилна ангина пекторис/ БСТЕМИ кои се со висок ризик од појава на несакани коронарни збиднувања пред дијагностичка ангиографија или перкутани коронарни интервенции, односно кај кои не се планира дијагностичка ангиографија или перкутани коронарни интервенции~~